

**Prospect: Informații pentru utilizator****Dentinox – Gel 10 g gel gingival**

tinctură de *Matricaria chamomilla* (mușețel), clorhidrat de lidocaină monohidrat, lauromacrogol 400

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Dentinox – Gel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dentinox – Gel
3. Cum să utilizați Dentinox – Gel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Dentinox – Gel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Dentinox – Gel și pentru ce se utilizează**

Utilizat în mod tradițional în tratamentul iritației, inflamației gingiilor și durerii provocate de erupția dentară la copii în timpul apariției dentiției primare. În cazul înroșirii sau umflării grave a gingiei sau în cazul unor complicații severe concomitente, vă rugăm să luați legătura cu medicul dumneavoastră. Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dentinox – Gel****Nu utilizați Dentinox – Gel:**

- dacă sunteți alergic la tinctura de *Matricaria chamomilla* (mușețel), clorhidrat de lidocaină monohidrat sau aneestezice similare de tip amidic și lauromacrogol 400 sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Dentinox – Gel, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Se recomandă evitarea contactului gelului gingival cu ochii.

**Dentinox – Gel împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, cu toate că datorită căii de administrare este foarte puțin probabilă interacțiunea Dentinox – Gel cu alte medicamente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Nu este cazul.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu este cazul.

### **Dentinox – Gel conține sorbitol**

Datorită conținutului de sorbitol, acest medicament nu trebuie utilizat de pacienții care suferă de intoleranță rară congenitală la fructoză. (Fiecare 1 g de gel conține 100 mg de sorbitol, echivalent cu mai puțin de 0,01 unități glucidice. Valoarea calorică este de 2,6 kcal / g sorbitol.)

### **Dentinox – Gel conține Propilenglicol**

După aplicarea locală la nivelul mucoasei orale, este posibilă apariția iritațiilor locale datorită conținutului de propilenglicol.

## **3. Cum să utilizați Dentinox – Gel**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Vă rugăm să respectați recomandările următoare, altfel Dentinox – Gel nu va fi eficient.

Când apar primele semne ale erupției dentare, aplicați o mică cantitate de Dentinox – Gel (cât un bob de mazăre) pe zona gingivală afectată cu ajutorul unui deget curat sau al unui bețișor cu vată curată și masați ușor.

Aplicarea se repetă de 2 – 3 ori pe zi, în special după mese și înainte de culcare.

Dentinox – Gel se aplică copiilor doar când este cazul.

Medicamentul se folosește ocazional; poate fi folosit la erupția tuturor dinților de lapte, precum și la erupția molarilor.

### **Dacă utilizați mai mult Dentinox – Gel decât trebuie**

Dacă ați aplicat o cantitate mai mare de Dentinox – Gel, cresc șansele de apariție a reacțiilor adverse (vezi punctul „Reacții adverse posibile”). În acest caz vă rugăm să opriți administrarea Dentinox – Gel la copii și să discutați cu medicul dumneavoastră.

### **Dacă uitați să utilizați Dentinox – Gel**

Nu aplicați copiilor o doză dublă de Dentinox – Gel pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazul respectării recomandărilor de utilizare nu este de așteptat să apară reacții adverse.

Totuși, datele din literatura de specialitate au indicat că mușșetelul, una dintre substanțele active ale Dentinox – Gel, poate determina reacții alergice. Reacțiile de hipersensibilitate determinate de mușșetel se manifestă sub formă de dispnee (greutate în respirație) la persoanele cu hipersensibilitate.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Dentinox – Gel**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și tub după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentul ambalat pentru comercializare: 5 ani.

Medicamentul după prima deschidere a tubului: 1 an.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Dentinox – Gel**

- Substanțele active sunt: tinctura de *Matricaria chamomilla* (mușețel) 1500 mg, clorhidrat de lidocaină monohidrat 34 mg, lauromacrogol 400 32 mg.

- Celelalte componente sunt: sorbitol soluție 70% (necristalizat) (Ph.Eur.), xilitol, propilenglicol, carbomer (974 P), hidroxid de sodiu (soluție 10%), polisorbitat 20, edetat de sodiu (Ph.Eur.), levomentol, zaharină sodică, apă purificată.

### **Cum arată Dentinox – Gel și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de gel clar, de culoare maro deschis, cu miros caracteristic de mușețel și mentol. Este disponibil în cutii cu un tub din aluminiu, acoperit în interior cu un lac pe bază de rășină epoxi-fenolică, prevăzut cu membrană de sigilare și închis cu capac cu filet, din PEÎD, de culoare albă; tubul conține 10 g gel gingival.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR PHARMAZEUTISCHE  
PRÄPARATE LENK&SCHUPPAN KG  
Nunsdorfer Ring 19, D-12277 Berlin,  
Germania

**Acest prospect a fost revizuit în august 2019.**